

ADMINISTRATION DU VACCIN ANTI-VPH

LES CLÉS DU SUCCÈS

Afin d'appuyer les décideurs, la London School of Hygiene & Tropical Medicine et PATH ont mené une revue de l'expérience acquise en matière d'administration du vaccin anti-VPH dans 46 pays à revenu faible et intermédiaire. Ces activités proviennent de 12 programmes nationaux et 66 projets de démonstration, dont certains ont mis en oeuvre différentes stratégies d'administration, ce qui représente l'équivalent de 92 expériences distinctes de vaccination.



PRÉPARATION

- Assurez-vous à l'avance de bénéficier d'un soutien politique de haut niveau.
- Associez les ministères de la Santé, de l'Éducation et des Finances aux activités de planification et de préparation.
- Utilisez, dans la mesure du possible, les systèmes existants du programme de vaccination de routine.
- Intégrez la planification pour le vaccin anti-VPH à la microplanification existante.
- Acheminez les vaccins anti-VPH vers les districts et les centres de santé en même temps que les autres vaccins de routine.
- Formez les professionnels de la santé et enseignants au moins deux mois avant la vaccination. Incluez notamment une formation sur la manière de répondre aux questions et de faire taire les rumeurs.

CONSEIL POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ DU PROGRAMME

Préparez à l'avance des stratégies pour communiquer, administrer le vaccin et éviter les pièges en intégrant au maximum le nouveau vaccin anti-VPH dans les activités existantes du PEV de routine.



COMMUNICATION

- Communiquez des messages clés : la vaccination anti-VPH est sûre, elle prévient le cancer du col de l'utérus et est soutenue par le gouvernement.
- Communiquez tôt et en personne avec les parents, les filles scolarisées ou déscolarisées et la communauté dans son ensemble. Munissez-vous d'un plan pour répondre aux rumeurs.
- Sensibilisez au programme, et ce, dès le départ, les enseignants, les chefs religieux et communautaires, ainsi que les écoles privées.
- Mettez en œuvre des activités de mobilisation sociale au moins un mois avant le lancement de l'administration du vaccin.
- Recourez au consentement « opt-out » (avec option de refus des parents) ou à une politique de consentement en adéquation avec la vaccination de routine.

CONSEIL POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ DU PROGRAMME

Planifiez des activités de communication adaptées pouvant être répétées à chaque dose, chaque année.



ADMINISTRATION DU VACCIN

- Administrez les vaccins à l'école pour cibler une proportion importante de filles éligibles.
- Administrez les vaccins dans les communautés et les centres de santé afin d'atteindre les filles déscolarisées ou absentes de l'école.
- Établissez clairement quelles filles sont éligibles au vaccin anti-VPH et leur nombre au sein de la communauté.
- Administrez deux doses de vaccin anti-VPH à au moins six mois d'intervalle.
- Administrez une troisième dose de vaccin anti-VPH six mois après la deuxième dose aux filles séropositives VIH ou immuno-compromises.
- Limitez le taux d'abandon en administrant toutes les doses sur une seule année scolaire.

CONSEIL POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ DU PROGRAMME

Prêtez une attention particulière au coût du programme et adoptez une stratégie d'administration du vaccin (lieux et périodes de vaccination) pouvant être reproduite chaque année.



ENJEUX

- Assurez-vous d'une forte coordination entre les secteurs de la santé et de l'éducation.
- Prévoyez au moins un mois avant le début de la vaccination pour préparer et sensibiliser les communautés, en prenant soin de ne pas sous-estimer le temps nécessaire pour mettre en œuvre ces activités.
- Mettez en place des stratégies d'administration du vaccin qui permettent d'atteindre les filles déscolarisées.
- Veillez à ce que tous les chefs religieux, communautaires et responsables éducatifs soient au fait du programme de vaccination anti-VPH.
- Veillez à ce que tous les chefs religieux, communautaires et responsables éducatifs disposent d'un plan de communication de crise opérationnel en cas d'apparition de rumeurs.

**POUR PLUS
D'INFORMATIONS :**
www.rho.org/HPVlessons